

Bovikalc®



*Boîte de 4 boli de 190 g,
contenant chacun 43 g de calcium.
Doos met 4 boli van 190 g,
die elk 43 g calcium bevatten*

Usage vétérinaire exclusif - Uitsluitend
voor diergeneeskundig gebruik

Complément calcique pour vaches :
s'utilise en complément à la ration
durant la période péri-partale chez des
vaches prédisposées à l'hypocalcémie
(fièvre de lait) ou comme complément
à la perfusion de calcium dans le traite-
ment de la fièvre de lait.

Calciumsupplement voor koeien : wordt
gebruikt ter aanvulling van het rantsoen
rond de partus bij koeien gepré-
disponeerd voor hypocalcemie (melk-
of kalfziekte) of als supplement bij een
infuus ter behandeling van melk- of
kalfziekte.

Composition

1 bolus contient :

Chlorure de calcium dihydraté 110.0 g

Sulfate de calcium hémihydraté 44.1 g

Eau 27.3 g

Polyéthylène-
glycolglycérylcricinoléate 8.6 g

Administration

Bovikalc® s'administre par voie orale, au
moyen de l'applicateur prévu à cet effet.

*Complément à la ration des vaches
prédisposées : administrer 4 boli*

- Bolus 1: à l'apparition des premiers
signes de vêlage
- Bolus 2: immédiatement après le vêlage

- Bolus 3: 12 à 15 heures après le bolus 2
- Bolus 4: 12 à 15 h. après le bolus 3,
soit 24 à 30 h. après le vêlage

*Complément à la perfusion de calcium:
administrer 2 boli*

- Bolus 1: 2 à 3 heures après la
perfusion de calcium
- Bolus 2: 12 à 15 heures après le bolus 1

Précautions particulières

N'administrer Bovikalc® qu'au moyen de
l'applicateur adéquat.

Ne pas administrer à des vaches
présentant des signes cliniques de
fièvre de lait, étant donné que leur
réflexe de déglutition peut être perturbé.

Ne pas administrer en cas de parésie.
Avant administration, veiller à ce que le
bolus soit en parfait état et que son
film protecteur soit intact.

Conservation

Conserver Bovikalc® dans un endroit
sec, à une température inférieure à 30°C.
Maintenir chaque bolus dans son
emballage plastique jusqu'au moment
de l'administration. Date d'expiration :
voir "EXP".

Samenstelling

1 bolus bevat:

Calciumchloridedihydraat	110.0 g
--------------------------	---------

Calciumsultaathemihydraat	44.1 g
---------------------------	--------

Water	27.3 g
-------	--------

Polyethyleen- glycolglycérylcricinoleaat	8.6 g
---	-------

Toediening

Bovikalc® wordt oraal toegediend met
een daarvoor bestemde applicator.

Rantsoenaanvulling bij gepredisponeerde koeien : 4 boli

- Bolus 1: bij de eerste tekenen van een naderende kalving
- Bolus 2: onmiddellijk na het kalven
- Bolus 3: 12 à 15 u na bolus 2
- Bolus 4: 12 à 15 u na bolus 3 of 24 à 30 u na het kalven

Supplement bij calciumperfusie : 2 boli

- Bolus 1: 2 à 3 uur na het infuus
- Bolus 2: 12 à 15 uur na bolus 1

Bijzondere voorzorgsmaatregelen

Bovikalc® enkel toedienen met een aangepaste applicator.

Niet toedienen aan koeien met klinische tekenen van melkkoorts omdat hun slikreflex verstoord zou kunnen zijn.

Niet toedienen in geval van paresis (verlamming).

Alvorens toe te dienen moet u erop letten dat de bolus in goede staat is (beschermlaag moet intact zijn).

Bewaring

Bewaar Bovikalc® op een droge plaats met een temperatuur die de 30°C niet overstijgt. Elke bolus moet in zijn oorspronkelijke verpakking bewaard blijven tot juist voor de toediening. Vervaldatum : zie "EXP".

Fabrikant:

Boehringer Ingelheim Danmark A/S
Strødamvej 52
2100 København
Danmark A/S

Distributeur/Verdeler:

n.v. Boehringer Ingelheim s.a., Brussels
N° d'agrément - Erkenningsnr :
12/1427/000/1000/00

B

1487-0103