

FRONTLINE® SPRAY

(fipronil) 100 of 250 ml

Oplossing voor uitwendig gebruik.

Handpomspray 100 ml: 1 x pompen = 0,5 ml
Handpomspray 250 ml: 1 x pompen = 1,5 ml

Voor bestrijding van vlooien (*Ctenocephalides spp.*) bij honden en katten en voor bestrijding en preventie van teken (*Rhipicephalus spp.* en *Ixodes ricinus*, overbrenger van Lyme Disease) bij honden.

Lees de volgende pagina's vóór gebruik.

Bewaren: Buiten de invloed van licht en warmtebronnen. Niet bewaren boven 25 °C (niet in de koelkast of vriezer bewaren).

DIERGEENESMIDDEL

Reg. NL 8783 - VRIJ

MERIAL B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velsbroek

VÓÓR DE BEHANDELING

PRODUCTINFORMATIE

FRONTLINE Spray kan op een eenvoudige en veilige manier worden toegediend. Zelfs zogende of drachtige dieren, pups en kittens kunnen zonder bezwaar met FRONTLINE worden behandeld. FRONTLINE Spray bevat alcohol en kan daardoor bepaalde materialen aantasten (b.v. gelakte oppervlakten).

Wij raden u aan de volgende pagina's aandachtig te lezen vóór u met de behandeling begint.

Enkele tips bij de behandeling

U mag uw huisdier twee dagen vóór en twee dagen na behandeling niet wassen. Voor een optimale werking dient u uw huisdier helemaal, tot op de huid, te bevochtigen met FRONTLINE. Tijdens het spuiten de flacon goed rechtop houden. Om de kop van het dier te behandelen kunt u het product op een washandje spuiten, waarmee u de kop zachtjes inwrijft. Dit om te voorkomen dat het product in de ogen, de neus of in de bek van het dier komt. Katten kunnen eventueel helemaal op deze manier worden behandeld. Twee dagen na de behandeling wordt de activiteit van FRONTLINE niet meer beïnvloed door regen, wassen (ook met shampoo) of zwemmen.

Na behandeling is uw dier gedurende vele weken beschermd tegen vlooien en teken:

WERKINGSDUUR

Hond	Kat
VLOOIEN tot 3 maanden	VLOOIEN tot 6 weken
TEKEN tot 4 weken	-

BIJSLUITER

FRONTLINE® SPRAY (fipronil)

Oplossing voor uitwendig gebruik
Honden en katten.

SAMENSTELLING

Fipronil	2,5 mg
Excipients q.s.	1 ml

INDICATIES

Bestrijding van vlooien (*Ctenocephalides spp.*) bij honden en katten. Bestrijding en preventie van teken (*Rhipicephalus spp.* en *Ixodes ricinus*, de overbrenger van Lyme Disease) bij honden.

DOSERING EN TOEDIENINGSWIJZE

Toediening

Uitwendige toepassing.

Gebruiksaanwijzing

Twee dagen vóór tot twee dagen na de behandeling het dier niet wassen, omdat daarvoor de vetlaag op de huid weggewassen kan worden. De gehele vacht vanaf een afstand van 10-20 cm bespuiten. Tegen de haargroei inspuiten, waarbij de gehele vacht nat moet worden. Masseer de vacht, in het bijzonder bij langharige dieren, zodat het product tot op de huid kan doordringen. Het gebruik van handschoenen wordt hierbij aanbevolen. De vacht op natuurlijke wijze laten drogen. Niet droogwrijven of föhnen.

DOSERINGSSHEMA

Dosering: dieren met een korte vacht

	Dosering in ml per kg lichaamsgewicht
1. Kat, kleine hond (lichter dan 5 kg)	4 ml per kg
2. (Middel) grote hond, kat (5 tot 15 kg)	3 ml per kg
3. Grote hond (15 tot 40 kg)	2 ml per kg
4. Zeer grote hond (zwaarder dan 40 kg)	80 ml per dier

	Overeenkomend met flacon 100 ml (1x pompen = 0,5 ml)	Overeenkomend met flacon 250 ml (1x pompen = 1,5 ml)
1.	8 x pompen per 1 kg	8 x pompen per 3 kg
2.	6 x pompen per 1 kg	6 x pompen per 3 kg
3.	4 x pompen per 1 kg	4 x pompen per 3 kg
4.	-	55 x pompen per dier

Dosering: dieren met een dichte of lange vacht

Bovenstaande dosering mag maximaal verdubbeld worden.

Doseerinterval: minimaal 4 weken.

Werkingsduur: FRONTLINE beschermt van 5 weken tot maximaal 3 maanden tegen vlooien en tot maximaal 4 weken tegen teken. De werkingsduur is afhankelijk van de infectiedruk.

Eigenschappen: Tijdens het bespuiten vormt het product een film, waardoor de vacht gaat glanzen.

DRACHT EN LACTATIE

Het product mag worden toegepast op drachtige en zogende dieren en op pups en kittens.

CONTRA-INDICATIES

Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen.

Bijwerkingen

Indien het product opgelikt wordt, kan een korte periode van overmatig speeksel worden opgemerkt, hoofdzakelijk te wijten aan het oplosmiddel. Onder de uitzonderlijk zeldzame vermoedelijke bijwerkingen werden voorbijgaande huidreacties, lokaal haarverlies, jeuk of roodheid gemeld na gebruik. Uitzonderlijk werden overmatig speeksel, omkeerbare neurologische symptomen (overgevoeligheid, depressie, nerveuze symptomen), braken of ademhalingsproblemen opgemerkt na gebruik. Niet overdoseren.

Voorzorgsmaatregelen bij gebruik

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat dieren elkaar niet likken na de behandeling. Laat honden niet toe te zwemmen binnen 2 dagen na toediening (zie rubriek 'Verwijdering'). Er kan een aanhechting voorkomen van een enkele teek. Hierdoor kan de overdracht van infectieuze ziekten onder ongunstige omstandigheden niet volledig uitgesloten worden.

Waarschuwingen voor het doeldier

Vorkom dat het product tijdens het sprayen in de ogen komt.

Voorzorgen voor de toediener

Dit product kan irritatie van de slijmvliezen en ogen veroorzaken, daarom moet contact van het product met de mond en ogen vermeden worden.

Dieren en toediener met een gekende overgevoeligheid voor insecticiden of alcohol moeten contact met Frontline Spray vermijden. Vermijd dat dit product in contact komt met de vingers. Indien dit optreedt, de handen wassen met zeep en water. Na accidentele blootstelling moet het oog zorgvuldig met zuiver water worden gespoeld.

Handen na behandeling wassen.

Behandelde dieren mogen niet aangeraakt worden tot de toedieningsplaats droog is, en kinderen mogen niet met de behandelde dieren spelen totdat de toedieningsplaats droog is. Daarom wordt het aanbevolen om dieren niet tijdens de dag te behandelen, maar in de vroege avond en om recent behandelde dieren niet toe te laten om te slapen bij de eigenaren, in het bijzonder kinderen.

Tijdens de toepassing niet roken, drinken of eten.

Behandelde dieren niet in contact laten komen met leder, geverfde of verniste oppervlakten voordat de vacht droog is, omdat incidenteel kleurveranderingen kunnen voorkomen bij contact met het niet opgedroogde product. Spray de dieren in een goed geventileerde ruimte.

BEWAREN

Niet bewaren boven 25°C. Niet in een koelkast of vriezer bewaren. Bewaar in de oorspronkelijke verpakking. Uit veiligheidsoverwegingen buiten de invloed van warmte houden (ontvlambaar).

Verwijdering van ongebruikt geneesmiddel of restanten

Ongebruikt product of afvalmateriaal moet in overeenstemming met de relevante nationale wetgeving afgevoerd worden. Fipronil kan een nadelig effect hebben op organismen die in het water leven. Verontreinig geen vijvers, waterlopen, of sloten met het product.

DIERGEENESMIDDEL

Reg. NL 8783 - VRIJ

Vervaardigd door: MERIAL, Lyon, Frankrijk

Voor Nederland: MERIAL B.V., Kleermakerstraat 10, 1991 JL Velsbroek

hr031008